

Avertissements agricoles

DLP - 7 - 5 - 96 - 18854

AVERTISSEMENT GRANDES CULTURES

destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès,
rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture.

N° 3 C du 02/05/96

GRANDES CULTURES N° 3

BLES : F1 étalée Traitez
POIS : floraison Traitez

BLES


La dernière feuille (F1) est maintenant bien étalée
et les barbes commencent à apparaître

La **Rouille brune** est présente sur la plupart des
parcelles, rarement à des niveaux élevés mais
déjà sur la F3; la **Septoriose** se manifeste
également sur les variétés les plus sensibles;
l'**Oïdium** est toujours virulent et atteint souvent
les étages supérieurs

Intervenez dès maintenant avec

Les parcelles déjà traitées (forte infestation de
rouille et Oïdium) selon notre avertissement du
17/04/96 devront l'être à nouveau afin de
continuer la protection sur la F1

Les Pucerons sont très présents sur les feuilles;
sauf en cas de fortes pullulations et sur blés bien
avancés (barbes sorties ou gaine fendue) il est
préférable d'attendre le prochain traitement (fin
épiaison-début floraison)



PAINDOR 0.33 L/HA
(+ Sandovit 0.33 l/ha)
OPUS 1 L/HA
supplémentez cette bouillie avec
CORBEL 0.5 L/HA
BOSCOR 0.5 L/HA



DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ZAC D'ALCO B.P. 3056
34034 MONTPELLIER CEDEX 01
Tél.: 67.10.19.50 - Fax : 67.03.10.21

PUBLICATION PÉRIODIQUE
IMPRIMERIE DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE DIRECTEUR M. FREYDIER - N° D'inscription 531 AD
ABONNEMENT ANNUEL - RÉGISSEUR DE RECETTES DE LA D.R.A.F.
C.C.P. MONTPELLIER 5238-12 G

POIS

Nous vous rappelons l'intervention à réaliser sur ces cultures en début floraison

Certaines maladies, en particulier l'Anthracnose, peuvent se développer avec les conditions humides

Les Pucerons sont maintenant très présents dans les boutons floraux

Intervenez avec

On voit également des symptômes de Bactériose (pourriture humide noirâtre au niveau des stipules) mais aucune lutte chimique ne peut s'envisager sur ce problème

La protection Fongicide et Insecticide est à renouveler 15 jours après votre 1^{re} intervention pour couvrir toute la phase de floraison des pois

CICERO	2	L/HA	ou
IMPACT TX 2		L/HA	
	+		
BEST	1.25	L/HA	
SERK EC	1.5	L/HA	
KARATE K	1.25	L/HA	
TALSTAR	0.075	L/HA	
		(0.2 L pour action bruches)	
BAYTHROID	0.25	L/HA	
		(0.6 L pour action bruches)	



MALADIES DU POIS PROTÉAGINEUX

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE SERVICES DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX


Mildiou



Face supérieure d'une foliole : symptôme en «tache d'huile»



Début de fructification sur la face inférieure



Fructification sur feuilles âgées et pousse

Oïdium




Attaque généralisée en phase de grossissement des gousses

Botrytis




Dégâts sur jeune gousse et destruction de fleur


Anthraxose



Infection primaire d'une plantule à partir du sol



Attaque sur feuille et pétiole



Attaque sur gousse, tige et pédoncule

75